

तुमच्या प्राण्यांमध्ये ब्रुसेल्लोसिसची लक्षणे दिसत आहेत का? आत्ताच कृती करा!



या लक्षणांकडे लक्ष ठेवा



मादा गायीं - म्हशींमध्ये 6 महिन्यांनंतर गर्भपात



प्लेसेंटा ची धारणा (ROP)



सांधे सूजणे (हायग्रोमा)

ब्रुसेल्लोसिस मानवांमध्ये पसरू शकतो!

प्रसार (ट्रान्समिशन) मार्ग



गर्भाशय स्त्रावांच्या संपर्कात येणे



कच्चे दूध पिणे



लक्षणे: सततचा ताप येणे, सांधे/स्नायू दुखणे, ऑर्क्यिटिस, थकवा येणे, रात्री घाम येणे इ.



वेळेवर उपचार मानवांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे!

- ❖ लवकर निदान झाल्यास विशिष्ट अँटीबायोटिक्सने बरे होऊ शकते
- ❖ जर तुम्हाला संसर्ग झाला किंवा लक्षणे दिसली तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

प्रतिबंध हाच एकमेव उपाय आहे!

गुरांसाठी

- 6-8 महिन्यांच्या मादा वासरांना लसीकरण करा.
- संशयित प्राण्यांना वेगळे करा/तपासणी करा.
- संक्रमित परिसराचे योग्य निर्जंतुकीकरण करा.



मानवांसाठी

- फक्त पाश्चराइज्ड किंवा उकळलेले दूध घ्या.
- उघड्या हातांनी प्लेसेंटा इत्यादी हाताळू नका.

तुम्ही हे केले आहे का ?

- ❖ तुमच्या 6-8 महिन्यांच्या मादा वासरांचे लसीकरण केले आहे का?
- ❖ तुमच्या पशुधनाची ब्रुसेल्लोसिस चाचणी केली का?
- ❖ जर नाही, तर आजच तुमच्या जवळच्या पशुवैद्यांशी संपर्क साधा!

