

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਬਰੂਸੈਲੇਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ!



ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।



ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਦਾ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਪਾਤ।



ਜੇਰ ਨਾ ਪੈਣਾ।



ਹਾਈਗ੍ਰੋਮਾ

ਬਰੂਸੈਲੇਸਿਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ!

ਫੈਲਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ:



ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ।



ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ।



ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ (ਅੰਡੂਲੈਂਟ ਬੁਖਾਰ), ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਜਨ (ਆਰਕਾਈਟਿਸ), ਥਕਾਵਟ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ



ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ!

- ❖ ਖਾਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਰੂਸੈਲੇਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
- ❖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

ਬਚਾਅ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ!

ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ:

- ਮਾਦਾ ਵਛੀਆਂ ਨੂੰ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਖੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
- ਸੰਕਰਮਿਤ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰੋ



ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ:

- ਸਿਰਫ ਉਬਲਿਆ ਜਾਂ ਪਾਸਚਰਾਈਜ਼ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤੋ
- ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛੂਹੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ?

- ❖ ਆਪਣੀ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਦਾ ਬਛੜੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ?
- ❖ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਰੂਸੈਲੇਸਿਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ?
- ❖ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

