

உங்கள் மாடுகளில் பிருசெல்லோசிஸ் அறிகுறிகள் இருக்கிறதா? இப்போதே நடவடிக்கை எடுக்கவும்!



இந்த அறிகுறிகளை கவனிக்கவும்:



பெண் கால்நடைகள்களில் 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு கருக்கலைப்பு



நஞ்சுக்கொடி தக்கவைத்தல்



ஹைக்ரோமா (முன்காலில் வீக்கம்)

பிருசெல்லோசிஸ் மனிதர்களுக்கு பரவலாம்!

பரவலுக்கான வழிகள்

மனிதர்களில் தோன்றும் அறிகுறிகள்



கருப்பை சுரப்புகளுடன் நேரடி தொடர்பு



பச்சை பால் குடிப்பது



அடிக்கடி வரும் காய்ச்சல் மூட்டு/தசை வலி, விதைப்பைவலி, சோர்வு, இரவு வியர்வை போன்றவை



சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை மனிதர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது

- ❖ ஆரம்பத்தில் கண்டறிந்தால், சிறப்பான ஆன்டிபயாடிக்ஸ் மூலம் குணப்படுத்தலாம்
- ❖ தொற்று ஏற்பட்டாலோ அல்லது அறிகுறி இருந்தாலோ உடனடியாக மருத்துவரை சந்திக்கவும்.

தடுப்பதே சிறந்த தீர்வு!

கால்நடைகளுக்காக:

- 6-8 மாத பெண்கன்றுகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தவும்
- சந்தேகத்திற்கிடமான மாடுகளை தனிமைப்படுத்தி பரிசோதிக்கவும்
- பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை முறையாக கிருமி நீக்கம் செய்யவும்



மனிதர்களுக்காக:

- பதப்படுத்தப்பட்ட அல்லது கொதிக்கவைத்த பாலை மட்டுமே பருகவும்
- பிரசவத்திற்குப் பிறகு வெறும் கைகளால் கையாள வேண்டாம்.

நீங்கள் இதை செய்துள்ளீர்களா?:

- ❖ உங்கள் 6-8 மாத பெண்கன்றுகளுக்கு தடுப்பூசி போட்டீர்களா?
- ❖ உங்கள் மாடுகளை பிருசெல்லோசிஸ்க்கு பரிசோதனை செய்தீர்களா?
- ❖ இல்லையெனில், இன்று உடனடியாக அருகிலுள்ள கால்நடை மருத்துவரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்!

