

ब्रुसेल्लोसिस से खुद को बचाएं

(पशु चिकित्सक और सहायक पशु चिकित्सक के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय)



महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय



टीकाकरण से पहले पशु का उचित नियंत्रण सुनिश्चित करें



वैक्सीन को मिलाकर
समय छीटों से बचें



पशु में प्रसूति संबंधी उपचार के समय हमेशा पीपीई पहनें

उच्च जोखिम वाली परिस्थितियां

जोखिम की स्थिति



प्रसूति संबंधी मामले

सुरक्षा विधि



हाथ में दो दस्ताने और
चेहरे का मास्क

जोखिम की स्थिति



टीकाकरण

सुरक्षा विधि



पशुओं को उचित रूप से
नियंत्रित करना



गर्भपात हुए भ्रूण/
जेर का निपटान



हाथ में दो दस्ताने और
चेहरे का मास्क



झाव से छीटे पड़ने
का जोखिम



आँखों की सुरक्षा
आवश्यक


निम्नलिखित लक्षण दिखाई देने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें




1 लगातार या रुक-रुक कर बुखार आना



2 अत्यधिक पसीना आना



3 वजन घटना



4 भूख में कमी



5 जोड़ों का दर्द



6 मिरदर्द

आपातकालीन उपाय

यदि रोगकारकों के संपर्क में आए, तो:

- संपर्कवाली जगह को तुरंत साबुन और पानी से धोएं।
- संपर्क की सूचना उच्च अधिकारी को दें।
- अधिक जोखिम वाली स्थिति में 24 घंटे के भीतर निदान करवाएं।

उचित सावधानियों से
ब्रुसेल्लोसिस की रोकथाम की
जा सकती है!

