

ப்ருசெல்லோசிலிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்கள்

(கால்நடை மருத்துவர்களும் துணை மருத்துவர்களும் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்)



முக்கிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்



தடுப்பூசியை மீண்டும் உருவாக்கும் போது ஏரோசோலைத் தவிர்க்கவும்.



தடுப்பூசி போடுவதற்கு முன், கால்நடைகளை சரியாக கட்டுப்படுத்துவது உறுதி செய்யுங்கள்.



மகப்பேறு வழக்குகளில் கால்நடைகளை கையாளும் போது எப்போதும் PPE அணியுங்கள்

அதிக ஆபத்து சூழ்நிலைகள்

ஆபத்து சூழ்நிலை



பிரசவ / மகப்பேறு சம்பந்தப்பட்ட நிலைகள்

பாதுகாப்பு முறைகள்




இரட்டை கையுறை (Double glove) மற்றும் முகக் கவசம் (Face shield)

ஆபத்து சூழ்நிலை



தடுப்பூசி போடுதல்

பாதுகாப்பு முறைகள்



கால்நடைகளை சரியாக கட்டுப்படுத்துதல்



கருச்சிதைவு அடைந்த குட்டி / பிளாசென்டா கையாளுதல்



இரட்டை கையுறை மற்றும் முகக் கவசம்




வெளியேற்றப்படும் திரவங்கள் (discharges) தெறிக்கும் அபாயம்



கண் பாதுகாப்பு அவசியம்


உங்களிடம் பின்வரும் அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்




1 தொடர்ச்சியான அல்லது இடையிடையான காய்ச்சல்



2 அதிக வியர்வை



3 உடல் எடை குறைதல்



4 உணவு விருப்பு குறைதல் (அனோரெக்சியா)



5 மூட்டு வலி



6 தலைவலி

அவசர கால நடவடிக்கை

தொற்றுக்கு உட்பட்டால்:

- பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை உடனே சோப்பும் தண்ணீரும் கொண்டு கழுவுங்கள்.
- தொற்று ஏற்பட்டதை உடனடியாக மேலதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கவும்.
- அதிக ஆபத்தான தொடர்புகளுக்குப் பின் 24 மணிநேரத்திற்குள் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யவும்.

சரியான முன்னெச்சரிக்கைகள் மூலம் ப்ருசெல்லோசிலைத் தடுப்பது சாத்தியம்!

